

INSERTO DEL PRODUCTO SINALGINA+

METAMIZOL SÓDICO 250 mg

Comprimidos orales
Uso veterinario – Caninos y felinos

1. COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:

- Metamizol sódico 250 mg
- Excipientes c.s.p. 1 comprimido

2. DESCRIPCIÓN

El metamizol sódico es un derivado pirazolónico con propiedades analgésicas, antipiréticas y espasmolíticas. Actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas, ayudando a controlar el dolor y la fiebre en perros y gatos.

3. INDICACIONES

Indicado para el tratamiento de:

- Dolor moderado a severo de origen musculoesquelético, visceral o postquirúrgico.
- Fiebre de diferentes etiologías.
- Espasmos gastrointestinales y cólicos leves.

A utilizar bajo prescripción y supervisión veterinaria.

4. ESPECIES DE DESTINO

- Caninos
- Felinos

5. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía oral.

Dosis recomendada:

- Caninos: 25–50 mg/kg cada 8–12 horas, según criterio veterinario.
- Felinos: 20–30 mg/kg cada 12 horas.

Equivalencias aproximadas (250 mg por comprimido):

- Perros de 5 kg: ½ comprimido
- Perros de 10 kg: 1 comprimido
- Perros de 20 kg: 2 comprimidos
- Gatos adultos (3–5 kg): ¼ a ½ comprimido

La duración del tratamiento dependerá de la evaluación del médico veterinario.

6. CONTRAINDICACIONES

No administrar en:

- Animales con hipersensibilidad a metamizol o a otros pirazolónicos.
- Animales con alteraciones severas hepáticas o renales.
- Estados de shock, hipotensión marcada o deshidratación severa.
- Gestación y lactancia, salvo criterio veterinario.
- No usar conjuntamente con otros fármacos que puedan causar depresión de médula ósea.

7. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Administrar con precaución en animales con antecedentes de trastornos hematológicos.
- No exceder la dosis recomendada.
- En caso de vómito, diarrea, letargia o cualquier reacción adversa, suspender el uso y contactar al veterinario.
- Mantener agua fresca disponible.

Reacciones adversas posibles:

- Vómito, diarrea, salivación excesiva.
- En casos raros: reacciones alérgicas, colapso, agranulocitosis.

8. INTERACCIONES

Evitar administrar junto con:

- Otros AINEs o corticoides (incrementa riesgo gastrointestinal).
- Anticoagulantes.
- Fármacos mielosupresores.
- Barbitúricos (pueden reducir la vida media del fármaco).

9. SOBREDOSIS

La sobredosis puede causar:

- Depresión del sistema nervioso central.

- Hipotermia.
- Vómitos severos.
- Shock.

En caso de sospecha, buscar atención veterinaria inmediata. Se recomienda tratamiento sintomático y soporte general

10. ALMACENAMIENTO

- Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.
- Mantener a temperatura no superior y 30 °C y HR 65%.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos.
- Mantener cerrado el empaque para preservar el producto.

11. PRESENTACIÓN

- Cajas con dos blísteres de 12 comprimidos de 250 mg.

12. USO VETERINARIO

Venta bajo prescripción veterinaria.